

**Statens livsmedelsverks kungörelse
om ändring i kungörelsen (SLV FS 1992:8)
med föreskrifter och allmänna råd om
karenstider vid hantering av livsmedel
från djur som behandlats med läkemedel;**

SLV FS 1998:7

(H 65:4)

Utkom från trycket
1998-04-27

beslutad den 24 april 1998.

Med stöd av 19 och 49 §§ livsmedelsförordningen (1971:87) beslutar Statens livsmedelsverk i fråga om verkets kungörelse (SLV FS 1992:8) med föreskrifter och allmänna råd om hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel

dels att bilaga 1 till kungörelsen skall ha följande lydelse,

dels att en ny bilaga 3 med följande lydelse skall införas i kungörelsen.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 maj 1998. Äldre regler skall dock tillämpas i fråga om djur som behandlats före ikraftträdandet.

ARNE KARDELL

Håkan Stenson
(Tillsynsenhet 1)

Rättelse blad till

**Statens livsmedelsverks kungörelse (SLV FS 1998:7)
med föreskrifter och allmänna råd om karenstider vid
hantering av livsmedel från djur som behandlats med
läkemedel**

Bilaga 1. I fråga om Flusan pour-on α -cypermetrin 15 g/l, skall karenstiden vid slakt av får vara 7 dygn.

Karenstider för vissa läkemedel eller därmed jämförbara medel

Streck (-) i tabellen i bilagan innebär att indikation saknas för ifrågavarande djurslag, siffra (även 0) innebär att medlet är bedömt och karenstiden fastställd.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjä- derfä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Avatec vet, pulver 15 % Roche	-	-	-	-	-	3 ^(*)		
Axilur vet, mixtur 2,5 % Hoechst Roussel Vet	-	-	14	-	-	-	6	-
Axilur vet, mixtur 10 % Hoechst Roussel Vet	9	-	-	-	5	-	4	-
Axilur vet, granulat 22 % Hoechst Roussel Vet	9	-	-	-	5	-	5	-
Axilur vet, pasta 19 % Hoechst Roussel Vet	-	-	-	-	5	-	-	-
Axilur vet, pulver 4 % Dos: 5 mg/kg Dos: 25 mg/kg Hoechst Roussel Vet	-	3	-	-	-	-	-	-
	-	14	-	-	-	-	-	-

^(*) Ej till värphöns

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjä- derfå</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Banminth vet, lösligt pulver 12,5 % <i>Pfizer</i>	30	7	14	14	-	-	-	-

Cygro vet, pulver 10 mg/g Roche/Veter	-	-	-	-	-	3 ^(*)	-	-
Dectomax vet, injektionsvätska 10 mg/ml <i>Pfizer</i>	49	-	im:45 sc:60	-	-	-	#	-
Dexafort vet, suspension för injektion 3 mg/ml <i>Intervet</i>	40	-	-	-	-	-	6	-
Dicural oral lösning 100 mg/ml <i>Fort Dodge Animal Health</i>	-	-	-	-	-	1 ^(*)	-	-

^(*) Ej till värphöns

Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

Tackor som producerar mjölk för livsmedelsproduktion skall ej behandlas under pågående laktationsperiod eller senare än 70 dygn före förväntad lammning.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjä- derfä</i>	<i>Mjolk</i>	<i>Ägg</i>
Dihydrostrepto- mycin vet, tabletter 500 mg <i>Bl-vet</i>	7	7	7	-	7	-	2	-

Engemycin vet, injektionsvätska 100 mg/ml Dos: ≤10 mg/kg Dos: >10-20 mg/kg <i>Intervet</i>	14 21	14 21	14 21	- -	- -	- -	4 6	- -
Eprinex pour-on vet, kutan lösning 5 mg/ml <i>MSD/Veter</i>	21	-	-	-	-	-	0	-
Equiffa vet, injektionsvätska <i>Rhone Mérieux/Lövens</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Equip F vet, injektionsvätska <i>Schering Plough/Veter</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Equip FT vet, injektionsvätska <i>Schering Plough/Veter</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Equip T vet, injektionsvätska <i>Schering Plough/Veter</i>	-	-	-	-	0	-	-	-

Preparat Tillverkare/ Ombud	Karenstid (dygn)							
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjä- derfü	Mjök	Ägg
Equus-flugspray för tävlingshästar Pyretriner I och II 1,4 vikts-% <i>Denka Agenturer AB</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Finadyne vet, injektionsvätska 50 mg/ml <i>Schering-Plough</i>	7	-	-	-	7	-	0	-
Electron öronbrickor cypermetrin (cis/trans) <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	0	-	-	-	-	-	0	-
Flusa pour-on α -cypermetrin 15 g/l <i>Fort Dodge Animal Health/Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	7	-	-	-	-	-	0	-
Fluвет vet, injektionsvätska 0,5 mg/ml <i>Lövens</i>	10	10	-	-	10	-	2	-
Hyonate vet, injektionsvätska 10 mg/ml <i>Bayer</i>	-	-	-	-	0	-	-	-

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjä- derfä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Insol Trichophyton vet, injektionsvätska suspension <i>Serumwerk Memsen/ Boehringer Ingelheim Danmark</i>	3	-	-	-	-	-	0	-
Intagen vet, pulver <i>Roche</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Maxipen vet, injektionsvätska 300 mg/ml <i>Pfizer</i>	14	14	-	-	14	-	8	-
Metacam injektionslösning 5 mg/ml <i>Boehringer Ingelheim</i>	15	-	-	-	-	-	-	-
Mira Fly Repellent N, N-dietyl-m- toluamid 20 vikts-% <i>Bayer</i>	-	-	-	-	10	-	-	-
Nobi-Equenza T vet, injektionsvätska <i>Intervet</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Nobi-vac Porcoli emulsion för injektion <i>Intervet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjä- derfå</i>	<i>Mjök</i>	<i>Ägg</i>
Nobilis CAV P4 vet, frystorkat virus <i>Intervet</i>	-	-	-	-	-	0	-	*
Nordpreum vet, injektionsvätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	-	0	-	-	-	-	-	-

Pyrantel vet, pasta 44 % Dos: 19 mg/kg Dos: 38 mg/kg <i>Bimeda/Vetpharma</i>	-	-	-	-	7 14	-	-	-
Quadrisol oral gel 100 mg/ml <i>Intervet</i>	-	-	-	-	12	-	-	-
Rabisin vet, vaccin, injektionsvätska <i>Lövens</i>	0	-	0	-	0	-	0	-

Ringvac Bovis LTF-130 injektions- substans <i>Alpharma/ Kontrollhudar</i>	0	-	-	-	-	-	0	-

* Ej till värphöns

<i>Preparat</i> <i>Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjä- derfü</i>	<i>Mjolk</i>	<i>Ägg</i>
Rintal vet, granulat 10 %								
Rekommenderad dos	7	-	-	-	21	-	5	-
Dos: 5 mg/kg	-	6	14	-	-	-	5	-
Dos: 10 mg/kg	-	-	21	-	-	-	7	-
Dos: 20 mg/kg	-	10	-	-	-	-	-	-
<i>Bayer</i>								
Rintal vet, mixtur 2,5 % och 10 %								
Rekommenderad dos	7	-	-	-	21	-	5	-
Dos: 5 mg/kg	-	-	14	-	-	-	5	-
Dos: 10 mg/kg	-	-	21	-	-	-	7	-
<i>Bayer</i>								
Rintal vet, pasta 8,87 %	-	-	-	-	21	-	-	-
<i>Bayer</i>								
Rintal vet, tabletter 100 mg								
Dos: 5 mg/kg	-	-	14	-	-	-	5	-
Dos: 10 mg/kg	-	-	21	-	-	-	7	-
<i>Bayer</i>								
Romefen vet, injektionsvätska 100 mg/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	4	4	-	-	4	-	0	-

Förteckning över vissa preparat som inte får användas till animalieproducerande djur

Enligt reglerna i rådets förordning (EEG) nr 434/97 om ändring i rådets förordning 2377/90 av den 20 juli 1990 om inrättande av ett gemenskapsförfarande för att fastställa maximalt tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung får vissa substanser inte användas vid behandling av djur inom animalieproduktionen. Dessa substanser ingår i ett antal preparat som finns upptagna i *bilaga 2* i denna kungörelse.

Till följd av reglerna i förordningen skall nedan angivna preparat utgå ur den bilagan.

<i>Preparat</i>	<i>Substans</i>
Celeston valerat med chionoform	kliokinol
Fucidin, salvkompresser	natriumfucidat
Fucidin, salva	natriumfucidat
Isopto-Pilocarpin, ögondroppar	pilokarpin
Mydriacyl, ögondroppar	tropicamid
Zincfrin, ögondroppar	metaoxedrin

